

N_{min}-Werte für Sommerungen in kg N/ha

Hauptfrucht	Oberbayern		Niederbayern		Oberpfalz		Oberfranken		Mittelfranken		Unterfranken		Schwaben	
	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig
Kulturen mit tiefer (0-90 cm) Durchwurzelung des Bodens														
S-Weizen, Durum, S-Roggen, S-Raps	65	65	51	53	47	50	62	62	64	64	59	61	68	68
Z-Rüben, F-Rüben	66	65	53	54	51	51	68	66	74	72	66	64	61	66
Silomais, Körnermais	73		69		51		65		68		67		66	
Sonstige Fruchtarten	65	66	58	58	51	53	63	62	61	62	65	65	65	66
Kulturen mit mittlerer (0-60 cm) Durchwurzelung des Bodens														
S-Gerste, Hafer	46	48	37	39	35	36	43	44	44	47	43	43	48	48
Sonnenblumen, Lein	43	44	36	38	38	40	50	47	45	46	45	46	50	49
Kartoffeln	44		43		42		44		42		50		50	
Sonstige Fruchtarten	48	50	43	42	38	38	47	45	45	45	48	46	48	49