

Krautfäule der Kartoffel

Stand der Berechnungen: 20. Juni
Empfehlung für die Erstbehandlung nach dem Modell Simphyt und dem Krautfäule-Monitoring

Gefährdungseinstufung:

 geringe Krautfäulegefahr = mit 1. Behandlung kann noch gewartet werden

 mittlere Krautfäulegefahr = Bestände intensiv kontrollieren

 hohe Krautfäulegefahr = Behandlung wird empfohlen

Ja Krautfäule bereits in der Region gefunden

Nein bisher keine Krautfäule festgestellt

Gefährdungsgruppe 1: anfällige Sorten, Staunässe, Feuchteinfluss durch Gewässer, Phytophthora in benachbarten Schlägen

Gefährdungsgruppe 2: alle anderen Schläge

Wetterstation Standort (Lks.)	Krautfäule in der Region	Gefährdungsgruppe	Auflauftermin				
			21. - 30. April	1. - 10. Mai	11. - 20. Mai	21. - 31. Mai	1.-10. Juni
Münchberg (HO)	Nein	1					
		2					
Euerhausen (WÜ)	Nein	1					
		2					
Obersteinbach (RH)	Nein	1					
		2					
Almesbach (NEW)	Nein	1					
		2					
Köfering (R)	Nein	1					
		2					
Wallerstein (DON)	Nein	1					
		2					
Langensallach (EI)	Nein	1					
		2					
Burgheim (ND)	Nein	1					
		2					
Baumannshof (PAF)	Nein	1					
		2					
Karlshuld (ND)	Nein	1					
		2					
Ainertshofen (AIC)	Nein	1					
		2					
Puch (FFB)	Nein	1					
		2					
Piering (SR)	Nein	1					
		2					
Uttenkofen (DEG)	Nein	1					
		2					
Neusling (DEG)	Nein	1					
		2					
Grub (EBE)	Nein	1					
		2					
Eichenried (ED)	Nein	1					
		2					