

Präparat	Wirkstoffe und -konzentration in g/l bzw. kg	HRAC-Wirkgruppe zur Gräserkontrolle	Maximale Aufwandmenge in ha	Kosten in €/ha ¹⁾	Anwendung in Kultur (kulturspezifische Aufwandsmenge beachten)	BBCH-Stadium	Wirkung auf Leitunkräuter und -ungräser																	
							Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Weidelgras	Trespe	Quecke	Flughafener	Ehrenpreis	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich	Kornblume	AusfallRaps	Stiefmütterchen	Storch-Schnabel	Taubnessel	Vogelmiere
Altivate 6 WG + FHS	Mesosulfuron 60	2	150 – 250 g + 0,6 – 1,0 l	40 – 66	WW,WR,WT	20 – 32	●*	●*	●	●*	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●*		
Atlantis Flex + FHS	Mesosulfuron 47 + Propoxycarbazone 68	2	200 – 330 g + 0,6 – 1,0 l	50 – 82	WW,WR,WT, WDU,DI	21 – 32	●*	●*	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		
Attribut	Propoxycarbazone 700	2	60 – 100 g	37 – 62	WW,WR, WT,DI	13 – 29	●*	●	●	●*	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○		
Avoxa	Pinoxaden 33 + Pyroxsulam 8	1 + 2	1,35 – 1,8 l	51 – 68	WW,WR,WT	13–32	●*	●*	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●*		
Axial 50	Pinoxaden 50	1	0,9 – 1,2 l	48 – 64	WW,WG,WR, WT,WDU,DI, SW,SG,SDU	13 – 39	●*	●	○	●*	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Axial Komplett	Pinoxaden 45 + Florasulam 5	1	1,0 – 1,3 l	45 – 59	WW,WG,WR, WT,SW, SG,SDU	13 – 29	●*	●	○	●*	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		
Broadway + FHS	Pyroxsulam 68 + Florasulam 23	2	130 – 220 g + 0,6-1,0 l	40 – 67	WW,WR,WT, WDU,DI, EM,SDU	12 – 30 (32)	●*	●*	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		
Broadway Plus + FHS	Pyroxsulam 240 + Florasulam 80 + Halauxifen 83	2	60 g + 1,0 l 40 g + 0,6 l	38 – 63	WW,WR,WT, WDU,DI, SW,SDU	21 – 32	●*	●*	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		
Husar Plus + Mero	Iodosulfuron 50 + Mesosulfuron 8	2	0,2 l + 1,0 l 0,15 l + 0,75 l	47 35	WW,WR, WT,DI,SW, SG,SDU	13 – 32 13 – 30	●*	●*	●	●*	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		
Incelo Komplett = Incelo + Husar OD + FHS	Mesosulfuron 47 + Thienicarbazone 15,8 + Iodosulfuron 100	2	200 g + 0,067 l + 1,0 l 300 g + 0,1 l + 1,0 l	59 88	WW,WR, WT,WDU,DI	20 – 32	●*	●*	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*		
Niantic + FHS, ... u.a.	Mesosulfuron 30 + Iodosulfuron 6	2	150 – 500 g + 0,3 – 1,0 l	23 – 75	WW	13 – 30 (32)	●*	●*	●	●*	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●*		
Sword 240 EC	Clodinafop 240	1	0,25 l	31	WW,WR, WT,WDU	21 – 39	●*	●	●	●*	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Traxos	Clodinafop 25 + Pinoxaden 25	1	1,2 l	60	WW,WR,WT	13 – 31	●*	●	○	●*	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

Die Einstufung der Herbizide erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Bedingungen und Standardanwendung der Mittel. * Gefahr der Resistenzentwicklung bei regelmäßiger Anwendung; ¹⁾ Preise nach aktueller Handelsliste für Großbebinde, ohne Mehrwertsteuer, Stand 2024; HRAC-Wirkgruppe: Gleiche Zahl = gleiche biochemische Wirkung = gleiches Resistenzrisiko; BBCH-Stadium = Entwicklungsstadium, z.B. 13 = 3. Blatt, 29 = Bestockungsende; Bindend für die Anwendung ist die Gebrauchsanleitung der einzelnen Präparate!
 Symbolerklärung: ○ = keine Wirkung, ◐ = geringe Wirkung, ◑ = mittlere Wirkung, ◒ = gute Wirkung, ◓ = sehr gute Wirkung; FHS = Formulierungshilfsstoff, WW = Winterweizen, WG = Wintergerste, WT = Winterroggen, WH = Winterhafer, WDU = Winterdurum bzw. Winterhartweizen, DI = Dinkel, EM = Emmer, SW = Sommerweizen, SG = Sommergerste, SR = Sommerroggen, ST = Sommertriticale, SH = Sommerhafer, SDU = Sommerdurum bzw. Sommerhartweizen
 Quelle Tabellen: LfL, Institut für Pflanzenschutz