

1 Fungizide in Zuckerrüben 2022 (Auswahl)

Präparat	Wirkstoff	Wirkstoffgehalt (g/l;kg)	zugelassene Aufwandmenge (kg;l/ha)	Anwendungs-termin	Formulierung	Anzahl Anwendungen	Wartezeit in Tagen	Kosten (€/l;kg)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist)	Auflagen NW	Abstand zu Gewässern (m)				Auflagen NT / NS	Wirkstoffverteilung		Cercospora	Ramularia	Echter Mehltau	Rost
											Regelabstand (m)	90 % Abdriftmind.	75 % Abdriftmind.	50 % Abdriftmind.		kontakt	system.				
Amistar Gold	Azoxystrobin Difenoconazol	125 125	1,0	ab BBCH 39	SC	2	35	42	12/23	605-1 606	5	*1	*1	5	keine		x	x(x)	xx(x)	xx	xxx
Domark 10 EC Emerald, Eminent	Tetraconazol	100	1,0	Bef.-beg. - BBCH 49	EC	2	28	27	12/22	642	*1	*1	*1	*1			x	x	x(x)	x(x)	+++
Mercury Pro	Cyproconazol Azoxystrobin	80 200	1,0	BBCH 39-49	SC	2	35	k.P.	05/21 (30.11.22)	605-1 606	5	*1	*1	5			x	xx	xx	xx	xxx
Microthiol WG	Schwefel	800	7,5	BBCH 39-49	WG	4	14		12/23	642-1	*1	*1	*1	*1		x				(x)	
Ortiva***/ Zaftra AZT 250 SC Zakeo 250 SC	Azoxystrobin	250	1,0	BBCH 39-49	SC	2	35	34- 39	12/22	605 606 705	5	*1	*1	5			x	x	++	+(+)	+++
Score	Difenoconazol	250	0,4	BBCH 39-49	EC	2	28	91	12/22	605 606	10	*1	5	5			x	x(x)	xxx	+(+)	++(+)
Sphere	Trifloxystrobin Cyproconazol	375 160	0,35	BBCH 31-49	SC	1	21	k.P.	05/21 (30.11.22)	605-1 606	10	*1	5	5			x	xx	++(+)	xxx	xxx
Thiopron	Schwefel	825	7,5	BBCH 39-49	SC	2	F	6,50	12/23	642-1	*1	*1	*1	*1		x				(x)	

x = Wirkungsbeurteilung für zugelassene Indikation; + = Wirkungsbeurteilung für zur Zeit nicht zugelassene Indikation

*1 = länderspezifischen Mindestabstand einhalten *** Solo-Strobilurinwirkstoff: Als Resistenzschutz mit geeignetem Fungizid kombinieren